

理解度確認テスト・脳神経系

氏 名 _____

問1. 前庭疾患における主要症状の組合せとして正しいのはどれか。

- a: 後肢麻痺
- b: 視力低下
- c: 前肢の疼痛
- d: 斜頸
- e: 眼振

- ① a、b
- ② a、c
- ③ b、c
- ④ b、d
- ⑤ d、e

問2. 神経学的検査の記述として正しいのはどれか。

- ① 皮筋反射は姿勢反応である。
- ② 固有位置感覚は脊髄反射である。
- ③ 立ち直り反応は姿勢反応である。
- ④ 屈曲反射は痛覚の検査である。
- ⑤ 踏み直り反応は脊髄反射である。

問3. 犬の特発性てんかん症例に対して広く使用される薬剤はどれか。

- ① イベルメクチン
- ② フロセミド
- ③ フェノバルビタール
- ④ スクラルファート
- ⑤ アンピシリン

問4. ハンセン I 型の椎間板ヘルニアの好発犬種はどれか。

- ① ミニチュアダックスフント
- ② 秋田犬
- ③ ミニチュアシュナウザー
- ④ セントバーナード
- ⑤ ブルテリア

問5. 脊髄反射と作動筋の組み合わせとして正しいのはどれか。

- ① 後肢の屈曲反射と上腕二頭筋
- ② 膝蓋腱反射と尾の筋群
- ③ 後肢の屈曲反射と体幹皮筋
- ④ 会陰反射と体幹皮筋
- ⑤ 膝蓋腱反射と大腿四頭筋

問6. 副交感神経の働きとして正しいのはどれか。

- ① 気管支筋の弛緩
- ② 瞳孔の拡大
- ③ 胃腸運動の減少
- ④ 心拍数の減少
- ⑤ 排尿筋の弛緩

問7. 交感神経の働きとして正しいのはどれか。

- ① 立毛筋が収縮する。
- ② 瞳孔が縮小する。
- ③ 消化管の蠕動運動が促進される。
- ④ 気管支筋が収縮する。
- ⑤ 心拍数が減少する(徐脈)。

問8. 神経学的検査にしばしば使用される検査器具はどれか。

- ① シルマー試験紙
- ② ペンライト
- ③ ウッド灯
- ④ スライドグラス
- ⑤ 聴診器

理解度確認テスト・脳神経系 正答

問1. 前庭疾患における主要症状の組合せとして正しいのはどれか。

- a: 後肢麻痺
- b: 視力低下
- c: 前肢の疼痛
- d: 斜頸
- e: 眼振

- ① a、b
- ② a、c
- ③ b、c
- ④ b、d
- ⑤ d、e

問2. 神経学的検査の記述として正しいのはどれか。

- ① 皮筋反射は姿勢反応である。
- ② 固有位置感覚は脊髄反射である。
- ③ 立ち直り反応は姿勢反応である。
- ④ 屈曲反射は痛覚の検査である。
- ⑤ 踏み直り反応は脊髄反射である。

問3. 犬の特発性てんかん症例に対して広く使用される薬剤はどれか。

- ① イベルメクチン
- ② フロセミド
- ③ フェノバルビタール
- ④ スクラルファート
- ⑤ アンピシリン

問4. ハンセン I 型の椎間板ヘルニアの好発犬種はどれか。

- ① ミニチュアダックスフント
- ② 秋田犬
- ③ ミニチュアシュナウザー
- ④ セントバーナード
- ⑤ ブルテリア

問5. 脊髄反射と作動筋の組み合わせとして正しいのはどれか。

- ① 後肢の屈曲反射と上腕二頭筋
- ② 膝蓋腱反射と尾の筋群
- ③ 後肢の屈曲反射と体幹皮筋
- ④ 会陰反射と体幹皮筋
- ⑤ 膝蓋腱反射と大腿四頭筋

問6. 副交感神経の働きとして正しいのはどれか。

- ① 気管支筋の弛緩
- ② 瞳孔の拡大
- ③ 胃腸運動の減少
- ④ 心拍数の減少
- ⑤ 排尿筋の弛緩

問7. 交感神経の働きとして正しいのはどれか。

- ① 立毛筋が収縮する。
- ② 瞳孔が縮小する。
- ③ 消化管の蠕動運動が促進される。
- ④ 気管支筋が収縮する。
- ⑤ 心拍数が減少する(徐脈)。

問8. 神経学的検査にしばしば使用される検査器具はどれか。

- ① シルマー試験紙
- ② ペンライト
- ③ ウッド灯
- ④ スライドグラス
- ⑤ 聴診器