

## 理解度確認テスト・呼吸器

氏 名 \_\_\_\_\_

問題1. ケネル・コフについて、誤っているものを1つ選びなさい。

- ① 接触感染を起こす。
- ② ワクチンによる予防は期待できない。
- ③ 乾性の短い咳を起こす。
- ④ 院内感染やペットショップ内感染を起こしやすい。
- ⑤ 感染動物は隔離する必要がある。

問題2. ネコの上部気道感染症候群について、誤っているものを1つ選びなさい。

- ① 接触感染を起こす。
- ② ワクチン接種は予防効果が期待できる。
- ③ 感染動物は隔離する必要はない。
- ④ 院内感染やペットショップ内感染を起こしやすい。
- ⑤ 器具や器材などからも間接的に感染する。

問題3. 肺胞内や間質内に体液が貯留する病態を1つ選びなさい。

- ① 肺気腫
- ② 胸水
- ③ 乳び胸
- ④ 肺水腫
- ⑤ 気胸

問題4. 呼吸器系疾患の動物を看護する際に注意すべき点として、適切なものを1つ選びなさい。

- ① 検査や処置が行いやすいように、保定は常に強く行う必要がある。
- ② チアノーゼを示している動物でも診察の順番は厳守する。
- ③ 肥満の改善など生活指導も重要である。
- ④ 入院中の動物に対する観察はストレスを与えないために最小限にする。
- ⑤ 検査や処置の妨げになるため、急変時の備えは最小限にする。

問題5. 気管虚脱に関する記述について、誤っているものを1つ選びなさい。

- ① 小型犬よりも大型犬に多い。
- ② 肥満した犬に起こりやすい。
- ③ ガチョウの鳴き声に似た咳をする。
- ④ 呼吸困難を起こすことがある。
- ⑤ X線検査では吸気時と呼気時の両方を撮影する。

## 理解度確認テスト・呼吸器 正答

問題1. ケンネル・コフについて、誤っているものを1つ選びなさい。

- ① 接触感染を起こす。
- ② **ワクチンによる予防は期待できない。**
- ③ 乾性の短い咳を起こす。
- ④ 院内感染やペットショップ内感染を起こしやすい。
- ⑤ 感染動物は隔離する必要がある。

問題2. ネコの上部気道感染症候群について、誤っているものを1つ選びなさい。

- ① 接触感染を起こす。
- ② ワクチン接種は予防効果が期待できる。
- ③ **感染動物は隔離する必要はない。**
- ④ 院内感染やペットショップ内感染を起こしやすい。
- ⑤ 器具や器材などからも間接的に感染する。

問題3. 肺胞内や間質内に体液が貯留する病態を1つ選びなさい。

- ① 肺気腫
- ② 胸水
- ③ 乳び胸
- ④ **肺水腫**
- ⑤ 気胸

問題4. 呼吸器系疾患の動物を看護する際に注意すべき点として、適切なものを1つ選びなさい。

- ① 検査や処置が行いやすいように、保定は常に強く行う必要がある。
- ② チアノーゼを示している動物でも診察の順番は厳守する。
- ③ **肥満の改善など生活指導も重要である。**
- ④ 入院中の動物に対する観察はストレスを与えないために最小限にする。
- ⑤ 検査や処置の妨げになるため、急変時の備えは最小限にする。

問題5. 気管虚脱に関する記述について、誤っているものを1つ選びなさい。

- ① **小型犬よりも大型犬に多い。**
- ② 肥満した犬に起こりやすい。
- ③ ガチョウの鳴き声に似た咳をする。
- ④ 呼吸困難を起こすことがある。
- ⑤ X線検査では吸気時と呼気時の両方を撮影する。